

สรุปผลการดำเนินงานควบคุมวัณโรค
งานสุขาภิบาลและป้องกันโรค
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนโรงพยาบาลอัมพวา

ความเป็นมา


งานสุขาภิบาลและป้องกันโรค โรงพยาบาลอัมพวา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักวิชาการ และดูแลคลินิกวัณโรค ทุกวันจันทร์ ในปีงบประมาณ 2560 มีผู้ป่วย 25 ราย ความเสี่ยงที่สำคัญคือ การเข้าถึงบริการน้อย พฤติกรรมสุขภาพ (บุหรี่ยา วัณโรคประจำตัว) การแพร่กระจายเชื้อ การรักษาไม่ต่อเนื่อง ซึ่งพบมากคือ TB ปอด มีโรคประจำตัว(DM HT DLPหัวใจ) โดยได้จัดทำกระบวนการเพื่อให้ได้คุณภาพโดย

1. การเข้าถึง
 - คัดกรองเชิงรุกในโรงพยาบาลและรพ.สต.ในกลุ่มเสี่ยง(สูงอายุ,โรคประจำตัว,HIV)
 - จัดระบบบริการ TB แบบ One Stop Service
2. การดูแล
 - ใช้ระบบการดูแลแบบ DOTS โดยเจ้าหน้าที่และมีระบบการติดตามอย่างสม่ำเสมอเพื่อประเมินผู้ป่วย
 - เฝ้าระวัง ADR จากยา TB โดย Clinic TB และเภสัชกรประจำ Clinic
3. การให้ข้อมูลเสริมพลัง
 - ได้รับการ Pre-post counseling ในผู้ป่วย TB ทุกรายโดยทีมสหวิชาชีพเช่นความรู้เรื่องโรคและการปฏิบัติตน คำแนะนำปัญหาและการใช้ยา ให้กำลังใจเพื่อลดความวิตกกังวล
4. การดูแลต่อเนื่อง
 - มีระบบการส่งต่อจากโรงพยาบาลไป รพ.สต.ในพื้นที่และนำไปให้ผู้ป่วยที่บ้าน
 - ให้เบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่แก่ผู้ป่วยทุกราย เพื่อโทรมาปรึกษาได้ตลอด 24 ชม.
 - ปฏิบัติตามการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยโดยทีมสหวิชาชีพทุกรายและโรงพยาบาลส่งต่อข้อมูลให้แก่ รพ.สต.ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

1. คำนทรายใหม่มีประสิทธิภาพ
2. รักษาหายและปลอดภัย

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาอัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรคน้อยกว่า 90%



ตารางแสดงสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยกินยาไม่ถูกต้อง

สาเหตุ	การพัฒนา
1. ผู้ป่วยกินยาไม่ถูกต้อง	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่อธิบายการกินยาที่ถูกต้องให้เอกสารคำแนะนำการกินยา - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยติดตามการกินยาของผู้ป่วยอย่างถูกต้อง - เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยจัดยาแยกเป็นซองรายวัน(ใส่ซองสีขา)
2. ผู้ป่วยไม่เข้าใจการกินยา	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่อธิบายการกินยาที่ถูกต้อง - โทรศัพท์ติดตามการกินยาเป็นระยะๆ
3. อาการข้างเคียงของยา	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำเอกสารคำแนะนำเกี่ยวกับอาการข้างเคียงของยา - ให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
4. ผู้ป่วยลืมกินยา	<ul style="list-style-type: none"> - จัดหาพี่เลี้ยงที่เชื่อถือได้กำกับการกินยา - ให้พี่เลี้ยงบันทึกการกินยาลงในสมุด

ความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงที่สำคัญ	แนวทางป้องกันและแก้ไข	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. ผู้ป่วยกินยาไม่ถูกต้อง 2. ผู้ป่วยลืมกินยา	- เจ้าหน้าที่อธิบายการกินยาที่ถูกต้องให้เอกสารคำแนะนำการกินยา - จัดหาพี่เลี้ยงที่เชื่อถือได้กำกับการกินยา - ให้พี่เลี้ยงบันทึกการกินยาลงในสมุดประจำตัว	- มีระบบการดูแลผู้ป่วยประเมินการกินยาอย่างต่อเนื่อง - มีระบบการเตือนและบันทึกการกินยา

ผลดำเนินการ

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ร้อยละความสำเร็จของการรักษาวัณโรค	90 %	89.47 % (17/19)	88.50 % (23/26)	88% (22/25)
ร้อยละการเปลี่ยนเสมหะจากบวกเป็นลบเมื่อสิ้นระยะเข้มข้น	90 %	89.47 % (17/19)	88.50 % (23/26)	88% (22/25)
ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง	100 %	100 %	100 %	100 %